

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

عنوان درس: آماروکاربرد آن در مدیریت ۲، کاربرد آمار در مدیریت بازارگانی، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

[www.PnuNews.Net](http://www.PnuNews.Net)

روش تحصیلی/ گذ درس: مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۲ - مدیریت صنعتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۰ - مدیریت بازارگانی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۸۷ - مدیریت بازارگانی (چندبخشی) ۱۲۳۵۰۰۵

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

- کدام یک از گزینه های زیر تعریف کارایی برآوردگر است؟

۱. به طور کلی برآوردگری بهتر است که همواره واریانس کمتری داشته باشد

۲. بین دو برآوردگر ناریب برآوردگری بهتر است که واریانس کمتری داشته باشد

۳. برآوردگری بهتر است که ناریب باشد

۴. بین دو برآوردگر سازگار موردي بهتر است که واریانس کمتری داشته باشد

- نمونه ای شامل ۵ مشاهده از جامعه ای با میانگین ۳ انتخاب نموده ایم. مشاهدات به صورت زیر بوده اند:

۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰ برآورد نقطه ای واریانس جامعه را حساب کنید.

۴. صفر

۷/۳ . ۳

۱۸/۸ . ۲

۲۳/۵ . ۱

- اگر نمونه ای تصادفی به حجم ۲۵ از توزیع نرمال دارای واریانس ۴ و میانگین ۱۵ باشد، کران بالای فاصله اطمینان %۹۹

برای  $\mu$  کدام است؟  $t_{0.005} = 2.4$

۱۶/۱۲۴۲ . ۴

۱۳/۹۶۸ . ۳

۱۸/۰۹۶ . ۲

۱۶/۲۳۲ . ۱

- نمونه ای تصادفی شامل ۱۲۰ دانشجو انتخاب کرده ایم که ۵۰ نفر از آنها از خانواده های مرفه بوده اند. مقدار واریانس نسبت

نمونه ای ( $\bar{P}$ ) کدام گزینه است؟

۴. قابل محاسبه نیست

۰/۴۱ ۷ . ۳

۰/۰ ۱۴۵ . ۲

۰/۰۵۰ ۲ . ۱

- در یک نمونه تصادفی به حجم ۲۰ از یک جامعه نرمال با واریانس نمونه ای برابر ۷۵ بوده است. مقدار

آماره آزمون واریانس جامعه کدام است؟

۶/۶۷ . ۴

۵۷ . ۳

۶/۳۳ . ۲

۶۰ . ۱

- اگر حد بالا و پایین یک فاصله اطمینان ۹۵٪ برای میانگین جامعه ای به ترتیب ۲۵ و ۳۵ باشند، برآورد نقطه ای میانگین

جامعه کدام است؟

۴. قابل محاسبه نیست

۱۰ . ۳

۳۰ . ۲

۳۱/۸ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

عنوان درس: آماروکاربرد آن در مدیریت، کاربرد آمار در مدیریت بازارگانی، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

- رشته تحصیلی/گذ درس: مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۳ - مدیریت پژوهشی (پژوهشی) ۱۲۳۵۰۰۵، مدیریت بازارگانی ۱۱۱۷۰۸۷ - مدیریت بازارگانی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۰

۷- کدام یک از گزینه‌های زیر از خصوصیات توزیع خی دو نیست؟

۱. مقادیر مثبت را می‌پذیرد.

۲. شکل این توزیع به درجه آزادی توزیع بستگی دارد.

۳. به طرف چپ کشیده است

۴. با افزایش درجه آزادی توزیع، به توزیع نرمال نزدیک تر می‌شود

۸- انحراف معیار طول ۲۵ پیج که توسط دستگاهی تولید شده اند برابر با ۴،۳۵ است. اگر طول پیج‌ها دارای توزیع نرمال باشد، کران پایین فاصله اطمینان ۹۵٪ برای انحراف معیار طول پیج‌ها کدام است؟ عدد جدول = ۳۹/۳۶۴۱

۶/۰۵۲

۳/۳۹۵

۱۱/۵۲۶

۳۶/۶۲۴

۹- اگر بر اساس یک نمونه تصادفی ۹ تایی از جامعه‌ای نرمال فاصله اطمینان ۹۵ درصدی میانگین جامعه به صورت (۵/۳۸, ۹/۶۲) باشد مقدار واریانس نمونه چقدر است؟

۳۶.۴

۳.۶

۹.۲

۸۱.۱

۱۰- اگر در برآورد فاصله‌ای درصد افراد رای دهنده، حجم نمونه از ۱۵۰۰ به ۴۰۰۰ افزایش یابد آنگاه کدام مورد اتفاق می‌افتد؟

۱. افزایش خطای استاندارد برآورد

۲. کاهش واریانس برآورد

۳. کاهش میزان اربیبی

۴. افزایش طول فاصله اطمینان

۱۱- ادعا شده است که میزان پراکندگی طول عمر لامپ‌های تولیدی یک کارخانه کمتر از ۳ واحد است. فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون این ادعا کدامند؟

$$\begin{cases} H_0: \sigma > 3 \\ H_1: \sigma \leq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0: \sigma < 3 \\ H_1: \sigma \geq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0: \sigma \leq 3 \\ H_1: \sigma > 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0: \sigma \geq 3 \\ H_1: \sigma < 3 \end{cases}$$

۱۲- کدام گزینه نادرست است؟

۱. ناحیه رد، برد مقادیری است که به ازای آنها فرض مقابل را رد می‌کنیم.

۲. خطای نوع اول احتمال رد به ناحق فرض صفر است

۳. جهت ناحیه رد موافق جهت فرض مقابل است

۴. اگر حجم نمونه از پیش تعیین شده باشد، فقط یکی از دو نوع خطای را می‌توان کنترل کرد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

عنوان درس: آماروکاربرد آن در مدیریت ۲، کاربرد آمار در مدیریت بازارگانی، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

- [www.PnuNews.Net](http://www.PnuNews.Net)

روش تحصیلی/گذ درس: مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۳ - ، مدیریت پژوهشی (چندبخشی) ۱۲۳۵۰۰۵

مدیریت بازارگانی ۱۱۱۷۰۸۷ - ، مدیریت بازارگانی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۸۷

۱۳- در نمونه ای به حجم ۱۵ از جامعه ای نرمال با انحراف معیار ۶ میانگین و واریانس نمونه ای به ترتیب ۵ و ۱۶ بوده اند. اگر مقدار ثابت میانگین تحت فرض صفر برابر ۷ باشد، مقدار آماره آزمون میانگین جامعه کدام است؟

-۱۲۱ .۴

-۳۲۳ .۳

-۴۸۴ .۲

-۰۵۴ .۱

۱۴- وزن بسته های فراورده ای که با ماشین بسته بندی می شوند دارای توزیع نرمال با  $\mu = ۱/۵$  گرم است. میانگین مطلوب وزن هر بسته  $= ۳/۷۵$  گرم است. نمونه ای تصادفی به حجم ۶ در هر ساعت طی عمل پرکردن انتخاب می کنیم. حد کنترل پائینی برای میانگین فرایند کدام است؟

۳۷۳/۱۶ .۴

۳۷۶/۸۴ .۳

۳۷۹/۵ .۲

۳۷۰/۵ .۱

$$\begin{cases} H_0: p = ۱۰۰ & \text{برای آزمون} \\ H_1: p = ۱۰۰ & \text{ناحیه رد آزمون} \end{cases} \text{ کدام است؟} \quad -۱۵$$

$$|z_0| < z_a .^4$$

$$|z_0| < z_{\frac{\alpha}{2}} .^3$$

$$|z_0| > z_a .^2$$

$$|z_0| > z_{\frac{\alpha}{2}} .^1$$

۱۶- اگر ۶ و  $S_p^2 = ۳$  و  $SSE = ۷$  باشد تعداد گروههای مورد مقایسه در آنالیز واریانس چند تا است؟

۵ .۴

۴ .۳

۶ .۲

۲ .۱

۱۷- حجم نمونه چقدر باشد تا توزیع نمونه ای  $\bar{X}$  با توزیع  $X$  یکسان شود؟

۴. کمتر از ۳۰

۳. بزرگتر از ۳۰

۱ .۲

۱. برابر با حجم جامعه

۱۸- اگر میانگین ۱۲ مشاهده برابر با  $\bar{x} = ۳/۶$  و  $\sum \sum X_{ij}^2 = ۱۰۲۴$  واریانس کدام است؟

۸۶۸/۴۸ .۲

۹۴۸/۴۰ .۱

۴. تعداد گروهها را نیز احتیاج داریم

۱۱۶/۸۰ .۳

۱۹- اگر وزن بسته های یک محصول غذایی دارای انحراف معیار  $۱/۵$  باشد و بخواهیم میانگین وزن بسته ها را با اطمینان ۹۵ درصد و با اختلاف حداقل  $۷/۱$  کیلوگرم برآورد کنیم حجم نمونه مورد نیاز چقدر باید باشد؟

$Z_{0.۰۲۵} = ۲$

۷۲ .۴

۱۸ .۳

۹ .۲

۳۶ .۱

۲۰- در آزمون مقایسه میانگین بیش از دو جامعه توزیع آماره آزمون کدام است؟

۴. نرمال

$F .^3$

$t .^2$

$\chi^2 .^1$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

عنوان درس: آماروکاربرد آن در مدیریت، کاربرد آمار در مدیریت بازارگانی، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

- رشته تحصیلی/ گد درس: مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۰ - مدیریت صنعتی ۱۱۱۷۰۱۳ - مدیریت پژوهشی (پژوهشی) ۱۲۳۵۰۰۵، مدیریت بازارگانی ۱۱۱۷۰۸۷ - مدیریت بازارگانی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۸۷

## ۴۱- کدام گزینه در مورد رگرسیون $Y$ روی $X$ نادرست است؟

۱. هر دو متغیر باید تصادفی باشند

۲. برای اندازه گیری رابطه خطی بین دو متغیر کمی استفاده می شود

۳. با روش کمترین مربعات براورد پارامترها محاسبه می شود

۴. ممکن است عرض از مبدا خط صفر باشد

## ۴۲- در مجموعه داده های جدول زیر مقدار ضریب همبستگی چقدر است؟

X	۷	۲	۵	۴	۳
Y	۴	-۱	۰	۲	۰

۱/۹۲۸ . ۴

/۷۲۶ . ۳

.۰/۶۷۶ . ۲

۱ . ۱

## ۴۳- در سوال قبل مقدار SSE کدام است؟

۴. صفر

۸/۶۹ . ۳

۱۱/۲۵۲ . ۲

۴/۲۴ . ۱

۴۴- اگر براورد خط رگرسیونی  $Y$  روی  $X$  به صورت  $\widehat{Y} = ۱/۵ - ۲X$  باشد مقدار پیش بینی  $Y$  به ازای  $X = ۰$  چقدر است؟

۱/۳ . ۴

-۱/۳ . ۳

۰ . ۲

-۱/۷ . ۱

## ۴۵- اگر $0 < r < 1$ ، همبستگی از کدام نوع است؟

۴. عدم وجود همبستگی

۳. کامل

۲. ناقص و معکوس

۱. مستقیم و ناقص

۴۶- با کدام یک از شرایط زیر توزیع  $t$  استیودنت به توزیع نرمال نزدیک می شود؟

۲. درجه آزادی کاهش یابد

۱. حجم نمونه کاهش یابد

۴. درجه آزادی به ۳۰ نزدیک شود

۳. واریانس افزایش یابد

۴۷- برای نظرخواهی از مخاطبان در مورد یک برنامه خاص حداکثر خطای براورد را  $10\%$  در نظر می گیریم. با اطمینان ۹۵ درصد حجم نمونه لازم برای این کار چقدر است؟ (فرض بر این است که  $50\%$  درصد از مخاطبان این برنامه را نگاه می کنند).

$$(z_{0.95} = 1.96)$$

۷۰ . ۴

۶۸ . ۳

۱۰۰ . ۲

۹۷ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

عنوان درس: آماروکاربرد آن در مدیریت، کاربرد آمار در مدیریت بازارگانی، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

- رشته تحصیلی/ گذ درس: مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۳ - ، مدیریت پژوهشی (پژوهشی) ۱۲۳۵۰۰۵، مدیریت بازارگانی ۱۱۱۷۰۸۷ - ، مدیریت بازارگانی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۰

- ۲۸ یک کارخانه تولید خودرو محموله های فیلتر روغن را در بسته های بزرگ دریافت می کند. برای بررسی این محموله ها نمونه ای شامل ۲۲۰ فیلتر را انتخاب نموده و اگر  $\bar{p} \leq 0.25$  ، محموله را می پذیرد.  $\bar{p}$  نسبت فیلترهای معیوب است. اگر سطح کیفیت قابل پذیرش یک محموله  $= 0.02$  باشد احتمال مخاطره تولید کننده کدام است؟

۰/۳۹۸۱ .۴

۰/۷۰۱۹ .۳

۰/۲۰۳۱ .۲

۰/۵۱۴۵ .۱

- ۲۹ اگر برای دو نمونه تصادفی مستقل از دو جامعه داشته باشیم  $n_1 = 7$  ،  $n_2 = 8$  ،  $s_1^2 = 14$  ،  $s_2^2 = 14$

$\bar{x}_1 = 5$  و  $\bar{x}_2 = 5$  مقدار واریانس ادغام شده کدام است؟

۴/۷۳۲ .۴

۴ .۳

۵/۰۷۷ .۲

۲۵/۷۸ .۱

- ۳۰ فرض کنید برای میانگین نامعلوم  $\mu$  از جامعه ای فاصله اطمینان ۹۵ درصد بر اساس یک آزمایش به صورت  $(\bar{x} \pm 1.96)$  است. کدام گزاره صحیح نیست؟

۱. احتمال اینکه  $\mu$  در فاصله  $[7/5, 2/5]$  باشد ۹۵٪ است

۲. احتمال اینکه  $\mu$  در فاصله  $[2/5, 7/5]$  نباشد ۹۵٪ است

۳. بازه  $(2/5, 7/5)$  جزء بازه های اطمینان ۹۵ درصدی برای  $\mu$  است

۴. احتمال اینکه  $\mu$  در فاصله  $(0, 2/5)$  باشد ۹۵٪ است

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

عنوان درس: آمار و کاربرد آن در مدیریت، کاربرد آمار در مدیریت بازارگانی، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

- رشته تحصیلی/گذ درس: مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۰ - مدیریت صنعتی ۱۱۱۷۰۱۳ - مدیریت پژوهشی (پژوهشی) ۱۱۱۷۰۸۷ - مدیریت بازارگانی (چندبخشی) ۱۲۳۵۰۰۵

مدیریت بازارگانی ۱۱۱۷۰۸۷ - مدیریت بازارگانی (چندبخشی) ۱۲۳۵۰۰۵

## فرمول‌های مورد نیاز درس آمار و کاربرد (۲)

$$d = \mu - \bar{x} = |\bar{x} - \mu|$$

$$L = \bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad U = \bar{x} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$L = \bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad U = \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\sigma_{\bar{P}}^2 = \frac{P(1-P)}{n} \quad S_{\bar{P}}^2 = \frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n} \quad d = |\bar{P} - p|$$

$$(L, U) = \bar{P} \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}}$$

$$L = \frac{(n-1)S^2}{\bar{x}_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)}} \quad U = \frac{(n-1)S^2}{\bar{x}_{(1-\frac{\alpha}{2}, n-1)}}$$

$$Z = \frac{\bar{x}_r - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad T = \frac{\bar{x}_r - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$Z = \frac{\bar{x}_r - \bar{x}_1}{\sigma(\bar{x}_1 - \bar{x}_r)} \quad \sigma_{(\bar{x}_1 - \bar{x}_r)}^2 = \frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma_r^2}{n_r}$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_r-1)S_r^2}{n_1 + n_r - 2} \quad T = \frac{\bar{x}_r - \bar{x}_1}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_r}}}$$

$$Z = \frac{\bar{P} - P_0}{\sigma \bar{p}} \quad \sigma \bar{p} = \sqrt{\frac{P_0(1-P_0)}{n}}$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

عنوان درس: آماروکاربرد آن در مدیریت ۲، کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی، کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

- رشته تحصیلی/ گذ درس: مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۳ - ، مدیریت صنعتی ۱۱۱۷۰۱۰ - مدیریت پژوهشی (پژوهشی) [www.PnuNews.Net](http://www.PnuNews.Net)

مدیریت بازرگانی ۱۱۱۷۰۸۷ - ، مدیریت بازرگانی (چندبخشی) ۱۲۳۵۰۰۵

$$x^r = \frac{(n-1)S^r}{\sigma_0^r}$$

$$SSR = \sum_{i=1}^k \frac{T_i^r}{n} - \frac{\bar{T}^r}{n}$$

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n x_{ij}^r - \frac{\bar{T}^r}{N}$$

$$SSE = SST - SSR$$

$$\bar{T} = \sum_{i=1}^n T_i$$

$$MSR = \frac{MSS}{k-1}$$

$$MSE = \frac{SSE}{N-K}$$

$$F = \frac{MSR}{MSE}$$

$$\hat{y} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x$$

$$\hat{\beta} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \quad \hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}\bar{x}$$

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} S_{yy}}} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{\left[ n \sum x_i^r - (\sum x_i)^r \right] \left[ n \sum y_i^r - (\sum y_i)^r \right]}}$$

$$SSE = S_{yy} - \frac{(S_{xy})^r}{S_{xx}}$$

$$\rho = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

$$S_{YY} = \sum_{i=1}^n y_i^r - n\bar{y}^r$$

$$S_{XY} = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$$